



TIPS VOOR HET BESTRIJDEN VAN RHINOPNEUMONIE (EHV₁)

Respecteer een paardenbubbel

- Beperk het transport en de transfers van paarden van stal naar stal.
- Een ruiter wordt verzocht niet naar verschillende stallen te gaan.
- Georganiseerde groepswandelingen worden afgeraden.
- Het kruisen van paarden tijdens een rit: houd zoveel mogelijk afstand en vermijd direct contact indien mogelijk.

Cursussen, stages, buitentrainingen

- Stages en buitenlessen zijn toegestaan mits respect voor het principe van de paardenbubbel en het protocol inzake Covid-19.
- Vermijd het binnenbrengen van vreemde paarden naar de stal.
- Buitentrainingen: toegestaan volgens de interne regels van elke stal, maar waarbij het contact met de paarden strikt wordt beperkt. Idealiter komt de instructeur aan, stapt uit zijn auto, gaat les geven en vertrekt meteen zonder de stallen te betreden. Hetzelfde principe voor hoefsmeden en osteopaten.

Vermijd overdrachten

- Streel niet alle paarden in de stal en raak alleen het paard aan waar de ruiter voor zorgt.
- Leen geen materiaal uit tussen paarden en ruiters.
- Handen wassen/desinfecteren en kleding regelmatig wassen.

Geen bijeenkomsten

- Alle competities zijn verboden tot en met 11 april 2021 ingevolge een beslissing genomen door de FEI en gevolgd door KBRSF en PaardenSport Vlaanderen.
- Trainingen, veilingen en andere evenementen buiten de eigen paardenbubbel worden afgeraden.
- Beperk de toegang tot de stallen tot de personen die daar echt moeten zijn.


Blijf alert voor symptomen

- Koorts, zwelling van de ledematen.
- Ademhalingsziekte: loopneus, hoesten.
- Neurologische tekens en verlamming: gebrek aan coördinatie, moeite met lopen, zwakte, incontinentie of moeilijk urineren/stoelgang maken, staartverlamming, onvermogen om te staan.

Mijn paard heeft symptomen. Wat moet ik doen?

- Bel uw dierenarts.
- Zet uw paard minimaal 3 tot 4 weken in quarantaine nadat de symptomen gestopt zijn.
- Paarden die in contact zijn geweest met het besmette paard moeten worden geïdentificeerd, geïsoleerd en getest.
- Kleed u om en douche voordat u een ander paard gaat verzorgen.

Ter herinnering: het virus besmet alleen paardachtigen. Toch is het overdraagbaar door mensen! Wanneer uw stal is aangetast, is het noodzakelijk om de eigenaars van paarden, uw hoefsmid en iedereen die naar de stal komt te verwittigen.



Breng tijdig uw vaccinaties in orde! Paarden zijn niet onmiddellijk beschermd tegen het virus. Het is belangrijk dat u uw paarden beschermt en immuniteit laat opbouwen voor toekomstige wedstrijden en samenkomsten.